

Ilustrowany przewodnik po biochemii klinicznej

Od wyniku laboratoryjnego do logicznej interpretacji



Biomarkery



• krew i mocz



• nerki



• wątroba



• serce




WYNIKI LABORATORYJNE

Data pobrania: 24.05.2024

BADANIE	WYNIK	JEDN.	ZAKRES REFERENCYJNY
KREW			
Hemoglobina	13,6	g/dl	12,0 – 16,0
Leukocyty	6,2	$10^3/\mu\text{l}$	4,0 – 10,0
CRP	2,1 ↑	mg/l	< 5,0
NERKI			
Kreatynina	1,05	mg/dl	0,70 – 1,20
eGFR	88	ml/min/1,73 m ²	≥ 90 ↓
Mocznik	32	mg/dl	17 – 43
WĄTROBA			
ALT	38	U/l	< 41
AST	31	U/l	< 40
Bilirubina całkowita	0,8	mg/dl	0,2 – 1,2
SERCE			
NT-proBNP	126 ↑	pg/ml	< 125



WYNIK TO PUNKT WYJŚCIA,
INTERPRETACJA PROWADZI DO WNIOSKÓW.
Łącz dane z kontekstem klinicznym.





Informacje o materiale



Ilustrowany przewodnik po biochemii klinicznej

© 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Zabrania się kopiowania, odsprzedaży, publicznego udostępniania oraz rozpowszechniania całości lub fragmentów materiału bez odpowiedniego zezwolenia.



Ważne

Interpretacja badań laboratoryjnych nigdy nie powinna opierać się na pojedynczym parametrze. Wynik należy zawsze oceniać w kontekście objawów, wywiadu, leków, wieku, stanu fizjologicznego, metody laboratoryjnej oraz zakresów referencyjnych stosowanych przez dane laboratorium. Materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje diagnozy, konsultacji lekarskiej ani lokalnych wytycznych postępowania klinicznego.



Dlaczego zakresy referencyjne mogą się różnić?

Ponieważ laboratoria mogą stosować różne analizatory, metody oznaczania, populacje referencyjne i jednostki. Dlatego w dalszej części przewodnika nacisk położono przede wszystkim na logikę interpretacji i wzorce zmian, a nie na zapamiętywanie jednej uniwersalnej wartości.



RAPORT LABORATORYJNY

ID pacjenta: 123456

Data pobrania: 12.05.2026

Materiał: surowica

Data wyniku: 12.05.2026

Badanie	Wynik	Zakres referencyjny
Sód (Na)	139	135–145 mmol/l
Potas (K)	4,3	3,5–5,1 mmol/l
Kreatynina	0,92	0,60–1,10 mg/dl
ALT	28	10–40 U/l
CRP	2,1	< 5,0 mg/l

zakres referencyjny



- 00 — Okładka
- 01 — Informacje o materiale
- 02 — **Spis treści**
- 03 — Jak korzystać z tego przewodnika



MODUŁ 01 — OD PRÓBKİ DO WYNIKU

- 04 — Wprowadzenie do modułu
- 05 — Czym naprawdę jest biochemia kliniczna?
- 06 — Zanim zinterpretujesz wynik: faza przedanalizyczna
- 07 — Krew: surowica, osocze i krew pełna
- 08 — Mocz: co mówi nam próbka?
- 09 — Jak czytać wynik laboratoryjny krok po kroku



MODUŁ 02 — NAJWAŻNIEJSZE BIOMARKERY METABOLICZNE

- 10 — Wprowadzenie do modułu
- 11 — Glukoza: więcej niż jedna liczba
- 12 — HbA1c: obraz glikemii w czasie
- 13 — Profil lipidowy
- 14 — Białko całkowite i albumina
- 15 — Enzymy jako biomarkery
- 16 — Sód, potas i chlorki
- 17 — Równowaga kwasowo-zasadowa
- 18 — Wapń, fosforany i magnez
- 19 — Jak połączyć panel metaboliczny?



MODUŁ 03 — OCENA FUNKCJI NEREK

- 20 — Wprowadzenie do modułu
- 21 — Kreatynina i eGFR
- 22 — Mocznik
- 23 — Albuminuria i białkomocz
- 24 — Badanie ogólne moczu
- 25 — Typowe wzorce nerkowe
- 26 — Przypadek: czy problem naprawdę leży w nerkach?



MODUŁ 04 — OCENA FUNKCJI WĄTROBY

- 27 — Wprowadzenie do modułu
- 28 — ALT i AST
- 29 — ALP i GGT
- 30 — Bilirubina
- 31 — Albumina i zdolność syntetyczna wątroby
- 32 — Wzorec hepatocytarny czy cholestatyczny?
- 33 — Przypadek: nieprawidłowe próby wątrobowe



MODUŁ 05 — BIOMARKERY SERCOWE

- 34 — Wprowadzenie do modułu
- 35 — Troponina
- 36 — CK-MB: miejsce i ograniczenia
- 37 — BNP i NT-proBNP
- 38 — Wynik sercowy zawsze ma kontekst
- 39 — Przypadek: ból w klatce piersiowej



MODUŁ 06 — ŁĄCZENIE WYNIKÓW W OBRAZ KLINICZNY

- 40 — Wprowadzenie do modułu
- 41 — Gospodarka żelazowa
- 42 — Markery stanu zapalnego
- 43 — Amylaza i lipaza
- 44 — TSH i hormony tarczycy
- 45 — Uniwersalny algorytm interpretacji



MODUŁ 07 — PRZYPADKI KLINICZNE I PODSUMOWANIE

- 46 — Wprowadzenie do modułu
- 47 — Przypadek 1: nerki + elektrolity
- 48 — Przypadek 2: metabolizm + wątroba + serce
- 49 — Mapa końcowa, najważniejsze zasady i źródła

Teorię już znasz. Teraz naucz się patrzeć na wyniki.

Biochemia kliniczna zaczyna się tam, gdzie pojedyncza liczba przestaje być tylko liczbą. Kreatynina, ALT, troponina czy glukoza nie stawiają diagnozy samodzielnie. Każdy wynik jest częścią większej historii: jaka próbka została pobrana, dlaczego wykonano badanie, co dzieje się z innymi parametrami i jaki jest stan pacjenta?

W tym przewodniku nauczysz się myśleć w 5 krokach



1. ZIDENTYFIKUJ –
Co dokładnie zmierzono?

2. PORÓWNAJ –
Czy wynik znajduje się poniżej, w obrębie czy powyżej zakresu referencyjnego?

3. POŁĄCZ –
Które inne parametry pomagają wyjaśnić zmianę?

4. UWZGLĘDNIJ KONTEKST –
Objawy, wywiad, leki, nawodnienie, wysiłek, czas pobrania i stan fizjologiczny mogą zmienić znaczenie wyniku.

5. ZADAJ KOLEJNE PYTANIE –
Jakich dodatkowych danych potrzeba, zanim wyciągniesz wniosek?



**Nie ucz się „wysoki marker = choroba X”.
Ucz się rozpoznawać wzorce.**


Każdy moduł prowadzi od prostego pytania do praktycznej interpretacji. Na końcu zobaczysz przypadki, w których kilka biomarkerów trzeba połączyć w jeden logiczny obraz.

MODUŁ 01

Od próbki do wyniku

Zanim zaczniesz interpretować liczby, sprawdź, skąd się wzięły.

Zrozumieć podstawy procesu laboratoryjnego i nauczyć się odróżniać rzeczywistą zmianę biologiczną od wyniku, na który mogły wpłynąć pobranie, przygotowanie pacjenta lub sposób postępowania z próbką.



W tym module:

- czym zajmuje się biochemia kliniczna,
- czym różnią się surowica, osocze i krew pełna,
- jakie informacje daje badanie moczu,
- czym są czynniki przedanalizacyjne,
- jak systematycznie czytać raport laboratoryjny.



Dobry proces interpretacji zaczyna się przed pierwszą liczbą.



Czym naprawdę jest biochemia kliniczna?



Biochemia kliniczna wykorzystuje pomiary substancji obecnych w płynach ustrojowych, aby dostarczyć informacji o procesach zachodzących w organizmie.

Najczęściej analizuje się krew i mocz, ale określone badania mogą wykorzystywać również inne materiały biologiczne.

Biochemia kliniczna wspiera proces diagnostyczny w:

- wykrywaniu nieprawidłowości
- ocenie funkcjonowania narządu
- monitorowaniu przebiegu choroby
- obserwowaniu odpowiedzi na leczenie
- ocenie ryzyka
- podejmowaniu decyzji o dalszej diagnostyce



PROCES BIOLOGICZNY



zmiana stężenia /
aktywności biomarkera



pomiar laboratoryjny



wynik



interpretacja
w kontekście klinicznym



Co to jest biomarker?

Biomarker to mierzalna cecha biologiczna, która dostarcza informacji o określonym procesie zachodzącym w organizmie.



Glukoza

gospodarka
węglowodanowa



Kreatynina

element oceny
funkcji nerek



ALT

marker związany
z uszkodzeniem
hepatocytów



Troponina

marker uszkodzenia
mięśnia sercowego



Biomarker nie zawsze jest swoisty dla jednej choroby.

Ten sam parametr może zmieniać się z różnych przyczyn.



„ALT jest podwyższone” to obserwacja.

„Pacjent ma konkretną chorobę wątroby”
to wniosek wymagający dodatkowych danych.

Zanim zinterpretujesz wynik: faza przedanalityczna



Nie każda nieprawidłowa liczba oznacza nieprawidłowy proces w organizmie.



Faza przedanalityczna obejmuje wszystko, co dzieje się przed właściwym pomiarem laboratoryjnym: przygotowanie pacjenta, pobranie materiału, jego oznaczenie, transport, przechowywanie i przygotowanie do analizy.



Tu również może powstać błąd.

Najważniejsze czynniki do sprawdzenia:

	Posiłek	Jedzenie może wpływać na stężenie wielu analitów (np. glukozy, lipidów, żelaza, triglicerydów).
	Nawodnienie	Odwodnienie lub nadmierne nawodnienie może zmieniać stężenia elektrolitów, białek i innych parametrów.
	Wysiłek fizyczny	Intensywny wysiłek może wpływać m.in. na enzymy mięśniowe, mleczany, mocznik, potas i CK.
	Leki i suplementy	Wiele leków i suplementów może wpływać na wyniki badań lub elementy próbki (np. biotyna, witamina C, heparyna).
	Pora pobrania	Parametry wykazują rytm dobowy (np. kortyzol, żelazo, TSH). Pobieraj zgodnie z zaleceniami.
	Hemoliza	Uszkodzenie erytrocytów może spowodować uwolnienie składników komórkowych do próbki i zaburzyć niektóre oznaczenia.


Hemoliza



Prawidłowy erytrocyt



Uszkodzenie erytrocytu



Składniki komórkowe uwalniają się do osocza/surowicy

Zanim zinterpretujesz nietypowy wynik, zapytaj:

- 1 Czy próbka była odpowiednia?
- 2 Czy pacjent był właściwie przygotowany?
- 3 Czy wynik pasuje do pozostałych parametrów?
- 4 Czy istnieje możliwość interferencji lub błędu przedanalitycznego?



**Najpierw sprawdź jakość informacji.
Dopiero potem interpretuj jej znaczenie.**

Krew to nie jedna próbka

Surowica, osocze i krew pełna — poznaj różnicę

1. KREW PEŁNA



Co zawiera?

Komórki krwi + płynną część krwi.



Przykładowe zastosowanie:

Niektóre oznaczenia wymagają zachowania wszystkich składników krwi.

2. OSOCZE



Co to jest?

Płynna część krwi uzyskana z próbki, w której zahamowano krzepnięcie.



Zawiera:

Wodę, elektrolity, białka, metabolity i czynniki krzepnięcia.

3. SUROWICA



Co to jest?

Płyn otrzymywany po wykrzepieniu krwi i oddzieleniu skrzepu.



Kluczowa różnica:

Nie jest tym samym co osocze; proces krzepnięcia wpływa na jej skład.

Materiał	Komórki	Czynniki krzepnięcia	Ogólna cecha
Krew pełna	Tak	Tak	próbka nieoddzielona
Osocze	Nie*	Tak	uzyskane z krwi z antykoagulantem
Surowica	Nie*	zmienione/zużyte w procesie krzepnięcia	uzyskana po wykrzepieniu

*po prawidłowym oddzieleniu składników komórkowych



Dlaczego to ma znaczenie?

Rodzaj materiału musi odpowiadać metodzie oznaczenia. Wynik uzyskany z niewłaściwej próbki może być trudny do porównania lub niewiarygodny.



TIP: Zawsze sprawdzaj typ materiału podany przy badaniu i wymagania konkretnego laboratorium.

Mocz: więcej informacji, niż może się wydawać



Badanie moczu pozwala obserwować zarówno procesy zachodzące w układzie moczowym, jak i część zmian ogólnoustrojowych.

1 STĘŻENIE I ROZCIEŃCZENIE

Informacje związane ze zdolnością nerek do gospodarowania wodą.

2 BIAŁKO / ALBUMINA

Ich obecność lub zwiększone wydalanie może być istotną wskazówką przy ocenie uszkodzenia nerek.

3 GLUKOZA I CIAŁA KETONOWE

Mogą dostarczać informacji o zaburzeniach metabolicznych, ale wymagają interpretacji razem z danymi z krwi i sytuacją kliniczną.

4 ELEMENTY BADANIA OGÓLNEGO

pH, krew/hemoglobina, azotyny, leukocyty i inne parametry mogą ukierunkować dalszą ocenę.



Rodzaj próbki ma znaczenie



Próbka jednorazowa

Daje obraz określonego momentu.



Pierwszy poranny mocz

Jest często bardziej skoncentrowany i może być preferowany w określonych zastosowaniach.



Zbiórka dobowa

Obejmuje mocz wydalony w określonym przedziale czasu i jest wykorzystywana przy wybranych oznaczeniach ilościowych.



Typowy błąd

Nie porównuj bezpośrednio każdego wyniku ze zbiórki dobowej z wynikiem z pojedynczej próbki. To różne sposoby pozyskania informacji.



Mini-checklista jakości próbki:

- ✓ właściwy pojemnik
- ✓ prawidłowe pobranie
- ✓ oznaczenie próbki
- ✓ odpowiedni czas transportu
- ✓ właściwe przechowywanie

Nie patrz tylko na czerwone liczby

—• Uniwersalny schemat pierwszej oceny wyniku •—



WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Badanie	Wynik	Jednostka	Zakres referencyjny	Oznaczenie
Glukoza (na czczo)	112 ↑	mg/dL	70 – 99	↑
Sód	138	mmol/L	135 – 145	↔
Potas	3,1 ↓	mmol/L	3,5 – 5,1	↓
Kreatynina	1,42 ↑	mg/dL	0,70 – 1,20	↑
eGFR (CKD-EPI)	54 ↓	mL/min/1,73 m ²	≥ 90	↓
ALT	78 ↑	U/L	7 – 56	↑
CRP	7,4 ↑	mg/L	< 5,0	↑

1 KROK 1 — CO ZMIERZONO?



Nazwij parametr i określ, jakiego procesu lub narządu może dotyczyć.

? Co biologicznie reprezentuje ten wynik?

2 KROK 2 — SPRAWDŹ JEDNOSTKĘ



Ta sama substancja może być raportowana w różnych jednostkach.

! Nigdy nie porównuj wartości liczbowych bez upewnienia się, że jednostki są zgodne.

3 KROK 3 — SPRAWDŹ ZAKRES REFERENCYJNY

↓
poniżej

↔
w zakresie

↑
powyżej

Zakres referencyjny opisuje wartości uzyskane według określonych kryteriów w populacji referencyjnej. Nie stanowi automatycznej granicy między „zdrowiem” a „chorobą”.

4 KROK 4 — SZUKAJ WZORCA



Jeden parametr to punkt. Kilka powiązanych parametrów tworzy wzorec.

Kreatynina ↑, eGFR ↓, albuminuria ↑
= znacznie więcej informacji niż sama kreatynina.

5 KROK 5 — DODAJ KONTEKST



wiek
objawy
wywiad
leki
nawodnienie
wysiłek
poprzednie wyniki
powód wykonania badania

6 KROK 6 — PORÓWNAJ W CZASIE

Pojedynczy wynik = zdjęcie.
Seria wyników = film.



12.01
1,40
mg/dL



12.02
1,28
mg/dL



12.03
1,18
mg/dL



ZŁOTA ZASADA WYNIK ≠ DIAGNOZA

Wynik + wzorec + kontekst + zmiana w czasie = znacznie lepsza interpretacja




Teraz, gdy potrafisz ocenić jakość i strukturę wyniku, możemy przejść do najważniejszych biomarkerów.

MODUŁ 02

Najważniejsze biomarkery metaboliczne

Od pojedynczego parametru do wzorca metabolicznego

Zrozumieć znaczenie najczęściej oznaczanych parametrów biochemicznych jako elementów większej całości. Glukoza, lipidy, elektrolity, białka i enzymy odzwierciedlają procesy fizjologiczne, a nie izolowane liczby.



W tym module:

- glukoza i jej znaczenie w określonym momencie;
- HbA1c jako wskaźnik długoterminowej ekspozycji na glukozę;
- podstawy interpretacji profilu lipidowego;
- znaczenie albuminy i białka całkowitego;
- rola enzymów jako biomarkerów;
- sód, potas i chlorki;
- podstawy równowagi kwasowo-zasadowej;
- wapń, fosforany i magnez;
- łączenie parametrów w logiczny panel metaboliczny.



Pojedyncza liczba informuje. Wzorzec wyjaśnia.

Glukoza: więcej niż jedna liczba




Glukoza jest podstawowym źródłem energii dla komórek. Jej stężenie we krwi jest nieustannie regulowane przez złożone mechanizmy hormonalne, w których kluczową rolę odgrywa insulina oraz hormony o działaniu przeciwnym (m.in. glukagon, adrenalina, kortyzol, hormon wzrostu). Dzięki temu organizm utrzymuje dostępność energii w różnych sytuacjach.

1 PO POSIŁKU



2 PRZY BRAKU PODAŻY GLUKOZY



Najpierw sprawdź warunki pobrania

- czy badanie wykonano na czczo
- ile czasu minęło od ostatniego posiłku
- czy występował ostry stres lub choroba
- czy pacjent przyjmuje leki wpływające na metabolizm glukozy
- czy wynik jest pojedynczy, czy powtarzalny



Wynik chwilowy

Stężenie glukozy we krwi zmienia się w czasie i może różnić się w zależności od: posiłku, stresu, wysiłku, infekcji, niektórych leków oraz aktualnego stanu metabolicznego organizmu.



Przykład interpretacji

Sytuacja A:	Glukoza podwyższona po obfitym posiłku.	→	Może być fizjologiczna i przejściowa. Wymaga oceny w kontekście sytuacji.
Sytuacja B:	Glukoza wielokrotnie podwyższona w standaryzowanych warunkach.	→	Może wskazywać na zaburzenia metabolizmu węglowodanów wymagające dalszej diagnostyki.



Glukoza = obraz „teraz”

Prezentuje sytuację metaboliczną organizmu w konkretnej chwili.



Ta sama strzałka „↑” nie musi mieć tego samego znaczenia.



Rozpoznanie zaburzeń metabolizmu węglowodanów powinno opierać się na właściwych kryteriach diagnostycznych, odpowiednim rodzaju testu i kontekście klinicznym, a nie na arbitralnym pojedynczym pomiarze.

HbA1c: spójrz dalej niż na dzisiejszą glukozę

• Wskaźnik długoterminowej ekspozycji na glukozę •


HbA1c dostarcza informacji o średniej ekspozycji erytrocytów na glukozę w dłuższym okresie i uzupełnia pojedynczy pomiar glikemii.



HbA1c — hemoglobina glikowana

Powstaje, gdy glukoza wiąże się z hemoglobiną w erytrocytach.

Im większa długoterminowa ekspozycja na glukozę, tym większy odsetek hemoglobiny glikowanej.



Glukoza chwilowa = zdjęcie

Pokazuje sytuację w danym momencie.

≠



HbA1c = obraz z dłuższego okresu

Pokazuje średnią ekspozycję na glukozę w ostatnich tygodniach–miesiącach.



Dlaczego nie należy czytać HbA1c w oderwaniu od reszty?

- czas życia erytrocytów
- produkcję erytrocytów
- utratę krwi
- obecność niektórych wariantów hemoglobiny
- transfuzje
- wybrane choroby hematologiczne i inne stany kliniczne



Kiedy wyniki nie pasują do siebie?



Glukoza: powtarzalnie podwyższona



HbA1c: nieoczekiwanie niska



Czy istnieje czynnik wpływający na HbA1c lub na aktualną glikemię?

Parametr	Co pokazuje?	Główne ograniczenie
Glukoza	sytuację w momencie pobrania	duża zmienność zależna od okoliczności
HbA1c	ekspozycję na glukozę w dłuższym okresie	zależy m.in. od biologii erytrocytów



Im bardziej wyniki są niespójne, tym ważniejsze staje się sprawdzenie mechanizmu biologicznego.

Profil lipidowy: nie oceniaj cholesterolu jako jednej liczby



Profil lipidowy opisuje kilka powiązanych parametrów transportu lipidów we krwi. Ich znaczenie zależy od całego profilu oraz od klinicznego ryzyka pacjenta.

LIPOPROTEINY – POJAZDY TRANSPORTUJĄCE LIPIDY



Cztery podstawowe elementy



Jak interpretować profil lipidowy? 5 kroków



Białka osocza: spójrz na produkcję, dystrybucję i utratę



Stężenie białek we krwi zależy nie tylko od produkcji, ale także od objętości płynów, dystrybucji między przestrzeniami ustrojowymi oraz utraty z organizmu.



Białko całkowite

Określa łączne stężenie głównych białek w surowicy lub osoczu.



≈



+



To uproszczone przedstawienie wizualne, a nie ścisła formuła analityczna.



Albumina

Jedno z najważniejszych białek osocza, syntetyzowane głównie w wątrobie.

Funkcje albuminy:



transportowe (np. kwasy tłuszczowe, leki, bilirubina, hormony)



związane z utrzymaniem ciśnienia onkotycznego



buforowe (równowaga kwasowo-zasadowa)



wiązania różnych substancji

Ciśnienie onkotyczne

To część siły osmotycznej związana z białkami osocza, która pomaga utrzymywać wodę w przestrzeni naczyniowej.

Dlaczego albumina może być obniżona?

Albumina ↓

1

mniejsza produkcja



Przykład:

zaawansowane zaburzenie funkcji syntetycznej wątroby

2

większa utrata



Przykład:

przez nerki lub przewód pokarmowy

3

redystrybucja / stan zapalny



Przykład:

zmiany w gospodarce białkowej

4

rozcieńczenie



Przykład:

zwiększona objętość płynu



Niska albumina nie oznacza automatycznie „choroby wątroby”.

To klasyczny przykład parametru, który wymaga interpretacji mechanistycznej.

Przykłady interpretacji



- Albumina ↓ + znaczny białkomocz = rozważ utratę nerkową jako jeden z mechanizmów.

- Albumina ↓ + inne cechy upośledzonej syntezy wątrobowej = znaczenie może być inne.



wątroba



albumina



naczynia krwionośne



nerki

Enzymy: sygnał procesu, nie gotowa diagnoza

Aktywność enzymów mierzona we krwi może wzrosnąć, gdy komórki uwalniają ich więcej lub ulegają uszkodzeniu. Podwyższony enzym sam w sobie nie wskazuje jednak automatycznie na jeden narząd ani jedną chorobę.



Enzym = cząsteczka, najczęściej białko, która przyspiesza określoną reakcję chemiczną w organizmie.

W medycynie laboratoryjnej najczęściej mierzymy „aktywność enzymatyczną”, a nie po prostu liczbę cząsteczek enzymu.



Przykładowe enzymy



ALT / AST → związane m.in. z oceną uszkodzenia hepatocytów.



ALP → interpretowana m.in. w kontekście dróg żółciowych i kości.



GGT → może pomagać w interpretacji zmian hepatobiliarno-żółciowych.



CK → związana głównie z mięśniami.



Lipaza → używana m.in. w ocenie procesów dotyczących trzustki.

Trzy pytania do każdego enzymu

1



Gdzie ten enzym występuje?

2



Co może powodować jego uwalnianie lub wzrost aktywności?

3



Które inne parametry pomogą ustalić źródło?



ALP ↑

Nie pytaj od razu: „Jaka to choroba?”

Najpierw zapytaj: „Czy źródło jest bardziej prawdopodobne w układzie hepatobiliarnym czy w kościach?”

Następnie szukaj danych wspierających jeden z mechanizmów.



Enzym jest wskazówką lokalizacyjną tylko wtedy, gdy uwzględnisz jego swoistość i pozostałe wyniki.

Elektrolity: małe jony, ogromne znaczenie

Sód, potas i chlorki są kluczowe dla gospodarki wodnej, pobudliwości komórek i równowagi kwasowo-zasadowej. Ich interpretacja wymaga myślenia o wodzie, nerkach, hormonach i stratach z organizmu.

Na⁺

SÓD



Najważniejsze skojarzenie:
gospodarka wodna
i osmolarność przestrzeni
zwnątrzkórkowej.



Kluczowa zasada:

Zmiany stężenia sodu często mówią
więcej o relacji między sodem a wodą
niż o bezwzględnej całkowitej zawartości
sodu w organizmie.



Pytania praktyczne:

- Czy pacjent utracił wodę?
- Czy zatrzymuje wodę?
- Czy występują znaczne zaburzenia glikemii lub osmolarności?
- Czy stosuje leki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową?

K⁺

POTAS



Najważniejsze skojarzenie:
pobudliwość mięśni i komórek,
w tym mięśnia sercowego.

W organizmie znacznie więcej potasu znajduje się wewnątrz komórek niż w osoczu, dlatego nawet niewielkie zmiany jego dystrybucji mogą istotnie zmienić wynik.



Najważniejsze czynniki wpływające na stężenie potasu:

- funkcja nerek
- równowaga kwasowo-zasadowa
- leki
- uszkodzenie komórek
- hemoliza próbki



Nieoczekiwanie wysokie stężenie potasu należy zawsze ocenić również pod kątem jakości próbki, ponieważ hemoliza może powodować wynik pozornie podwyższony.

Cl⁻

CHLORKI



Chlorek to główny anion zwnątrzkórkowy. Interpretujemy go najczęściej razem z sodem, wodorowęglanami i równowagą kwasowo-zasadową.

- Stężenie chlorków zmienia się wspólnie z sodem w odpowiedzi na gospodarkę wodną.
- Wzrost chlorków często idzie w parze ze spadkiem wodorowęglanów w kwasicy metabolicznej (hiperchloremicznej).
- Interpretacja zawsze wymaga spojrzenia na kontekst kliniczny i pozostałe elektrolity.

Czysta interpretacja w 5 krokach



Elektrolity interpretujemy jako układ, nie jako trzy niezależne liczby.

Równowaga kwasowo-zasadowa bez chaosu

• Najpierw rozpoznaj kierunek zaburzenia •




Organizm utrzymuje pH krwi w bardzo wąskim zakresie dzięki współpracy układów buforowych, płuc i nerek.




PŁUCA

regulują CO_2



KREW / BUFORY

stabilizują zmiany



NERKI

regulują wydalanie jonów H^+ i równowagę wodorowęglanową



pH

Informuje, czy środowisko jest bardziej kwaśne, czy bardziej zasadowe.



pCO₂

Odzwierciedla komponent oddechowy — zależy od wentylacji i eliminacji CO_2 .



HCO₃⁻

Reprezentuje kluczowy element komponentu metabolicznego.

Algorytm krok po kroku

1

KROK 1:

Sprawdź pH. Czy występuje kierunek: kwasicy czy zasadowicy?

2

KROK 2:

Sprawdź pCO_2 i HCO_3^- . Który parametr zmienia się w sposób wyjaśniający kierunek pH?

3

KROK 3:

Oceń, czy drugi układ próbuje kompensować zmianę.

4

KROK 4:

Zastanów się, czy wynik pasuje do prostego zaburzenia, czy może wskazywać na proces mieszany.

Typowy kierunek podstawowej zmiany

Główny proces	Typowy kierunek zmiany
kwasica metaboliczna	$\text{HCO}_3^- \downarrow$
zasadowica metaboliczna	$\text{HCO}_3^- \uparrow$
kwasica oddechowa	$\text{pCO}_2 \uparrow$
zasadowica oddechowa	$\text{pCO}_2 \downarrow$

Tabela pokazuje kierunek podstawowej zmiany, a nie pełną diagnostykę zaburzeń mieszanych.



Nie pomijaj kontekstu


- rodzaj pobranej próbki
- stan oddechowy
- perfuzja
- funkcja nerek
- obraz kliniczny
- dynamika zmian



Najpierw kierunek. Potem mechanizm. Na końcu przyczyna.

Wapń, fosforany i magnez: trzy minerały, jeden układ

Te parametry są silnie powiązane z czynnością nerek, kośćmi, hormonami i równowagą białkową.



WAPŃ

- uczestniczy w mineralizacji kości,
- przewodnictwie nerwowo-mięśniowym,
- skurczu mięśni,
- krzepnięciu krwi,
- transdukcji sygnałów komórkowych.

i Duża część wapnia we krwi jest związana z białkami, głównie albuminą. Dlatego wapń całkowity może się zmieniać wraz z albuminą, nawet jeśli biologicznie aktywny jonizowany wapń zachowuje się inaczej.



FOSFORANY

- ważne dla kości,
- metabolizmu energetycznego,
- błon komórkowych,
- równowagi kwasowo-zasadowej.

i Nerki odgrywają kluczową rolę w regulacji gospodarki fosforanowej.



MAGNEZ

- uczestniczy w wielu reakcjach enzymatycznych,
- wpływa na funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego.

i Nieprawidłowości magnezu często współistnieją z zaburzeniami innych elektrolitów.

Nie interpretuj wapnia bez albuminy

wapń całkowity ↓ + albumina ↓ = nie oznacza automatycznie rzeczywistego niedoboru biologicznie aktywnego wapnia.

i Sposób oceny wapnia powinien być dostosowany do sytuacji klinicznej i metody oznaczenia w laboratorium.

Uproszczony schemat następstw



Wapń + albumina + fosforany + magnez + funkcja nerek = znacznie pełniejszy obraz niż sam wapń.

Od panelu wyników do mapy metabolicznej

Nie czytaj raportu od góry do dołu. Grupuj wyniki według funkcji.

PRZYKŁADOWY PANEL WYNIKÓW (TA SAMA LISTA WYNIKÓW)		
	Glukoza (na czczo)	mg/dL
	HbA1c	%
	Sód (Na ⁺)	mmol/L
	Potas (K ⁺)	mmol/L
	Chlorki (Cl ⁻)	mmol/L
	HCO ₃ ⁻ (wodorowęglany)	mmol/L
	Białko całkowite	g/dL
	Albumina	g/dL
	ALT	U/L
	AST	U/L
	ALP	U/L
	GGT	U/L
	CK (kinaza kreatynowa)	U/L
	Wapń całkowity	mg/dL
	Fosforany	mg/dL
	Magnez	mg/dL
	Inne parametry zależne od panelu	—

TA SAMA LISTA — POGRUPOWANA FUNKCJONALNIE		
	BLOK 1 — GOSPODARKA GLUKOZOWA	Czy wynik pokazuje zmianę chwilową czy długoterminowy wzorec?
	BLOK 2 — GOSPODARKA WODNO-ELEKTROLITOWA	Czy wyniki tworzą spójny obraz nawodnienia, funkcji nerek i równowagi kwasowo-zasadowej?
	BLOK 3 — BIAŁKA	Czy możliwa jest zmiana produkcji, utraty, dystrybucji lub rozcieńczenia?
	BLOK 4 — ENZYMY	Jaki narząd lub proces może być źródłem wzrostu i które inne markery to potwierdzają?
	BLOK 5 — MINERAŁY	Czy wynik pasuje do funkcji nerek, poziomu albuminy i gospodarki mineralnej?



MINI-PRZYPADEK

Glukoza	↑
HbA1c	↑
Triglicerydy	↑
ALT	lekko ↑
Pozostałe elektrolity	bez istotnych zmian



Czy pięć oddzielnych odchyleń daje więcej informacji niż wspólny wzorec?

- 1 Glukoza i HbA1c zmieniają się w tym samym kierunku.
- 2 Triglicerydy mogą być powiązane z zaburzeniem metabolicznym.
- 3 ALT może stanowić dodatkową wskazówkę, ale nie rozstrzyga przyczyny.
- 4 Wyniki należy zestawiać z wywiadem, lekami, masą ciała i innymi danymi klinicznymi.



Nie stawiamy diagnozy na podstawie tego obrazka. To tylko sposób myślenia i interpretacji.



Tvoja rutyna interpretacyjna

- 1 Sprawdź próbkę i warunki pobrania.
- 2 Oznacz wyniki ↑ / ↓ / ↔.
- 3 Pogrupuj je według funkcji.
- 4 Poszukaj wyników zmieniających się wspólnie.
- 5 Zidentyfikuj możliwy mechanizm.
- 6 Sprawdź, co nie pasuje do wzorca.
- 7 Dodaj kontekst kliniczny.
- 8 Dopiero wtedy określ, czego trzeba dowiedzieć się dalej.



KLUCZ
MODUŁU

Nie pytaj tylko: „Co oznacza ten wynik?”
Pytaj: „Dlaczego te wyniki zmieniły się właśnie w taki sposób?”




W następnym module zastosujesz tę metodę do jednego z najważniejszych układów filtracyjnych organizmu — nerek.

MODUŁ 03

Ocena funkcji nerek

Filtracja, wydalenie i równowaga — jak czytać wzorce nerkowe

Nauczyć czytelnika interpretować podstawowe markery funkcji nerek, odróżniać parametry filtracji od markerów uszkodzenia oraz łączyć wyniki krwi i moczu w jeden logiczny obraz.



W tym module:

- kreatynina i jej ograniczenia,
- eGFR jako szacunkowa ocena filtracji,
- mocznik i jego kontekst,
- albuminuria i białkomocz,
- badanie ogólne moczu,
- typowe wzorce sugerujące zaburzenia funkcji nerek,
- integracja wyników w prostym przypadku klinicznym.



Prawidłowa interpretacja nerek wymaga więcej niż jednego wskaźnika.


Kreatynina i eGFR: patrz na filtrację, nie tylko na liczbę



Kreatynina jest użytecznym markerem pośrednim, ale jej stężenie zależy nie tylko od filtracji nerkowej. Dlatego interpretacja powinna uwzględniać eGFR oraz cechy pacjenta.

1 KREATYNINA

Kreatynina powstaje głównie w związku z metabolizmem mięśni. Jest usuwana z organizmu przede wszystkim przez nerki, dlatego wzrost jej stężenia może sugerować pogorszenie filtracji.



Ale:

- masa mięśniowa,
- wiek,
- dieta,
- niektóre leki,
- nawodnienie,
- dynamika zmian funkcji nerek.

masa mięśniowa / leki / nawodnienie

2 eGFR

eGFR — szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej

Jest obliczany na podstawie parametrów takich jak stężenie kreatyniny i cechy pacjenta, zgodnie z używanym równaniem.



Co oznacza?

Ma przybliżyć zdolność nerek do filtrowania osocza.



Kreatynina = zmierzony marker



eGFR = wynik oszacowania

3 Jak interpretować razem?

Kreatynina ↑ + eGFR ↓



wzorec zgodny z pogorszeniem filtracji, jeśli pasuje do sytuacji klinicznej.

Kreatynina bez istotnej zmiany



nie zawsze wyklucza zaburzenia funkcji nerek, szczególnie gdy produkcja kreatyniny jest nietypowa.

4 Trend jest ważny

Porównanie aktualnego wyniku z poprzednimi może być bardziej informacyjne niż pojedyncza liczba.



wynik A



wynik B



wynik C

Stabilnie czy narastająco?




W stanach szybko zmieniającej się funkcji nerek równania szacujące filtrację mogą mieć ograniczoną przydatność, ponieważ opierają się na założeniu względnej stabilności stężenia kreatyniny.



Kreatynina mówi „ile”. eGFR pomaga zapytać „jak wydolna jest filtracja?”.

Mocznik: marker nerkowy, ale nie tylko nerkowy

Stężenie mocznika zależy zarówno od wydalania przez nerki, jak i od produkcji wynikającej z metabolizmu białek.



Porównanie z kreatyniną

Parametr	Główne skojarzenie	Ważne czynniki pozanerkowe
Kreatynina	filtracja	masa mięśniowa, leki, dieta
Mocznik	wydalanie azotu	katabolizm, dieta, nawodnienie

Jeśli mocznik ↑, zapytaj:

- Czy kreatynina również wzrosła?
- Czy pacjent jest odwodniony?
- Czy występuje nasilony katabolizm?
- Czy dieta lub sytuacja kliniczna mogą zwiększać produkcję mocznika?

Mocznik ↑


Kreatynina ↔

Nie należy automatycznie uznawać tego za izolowane pogorszenie filtracji.

Mocznik jest użyteczny wtedy, gdy interpretujesz jego produkcję i wydalanie jednocześnie.

Albuminuria i białkomocz: kiedy filtr przepuszcza za dużo


Pojawienie się zwiększonej ilości albuminy lub innych białek w moczu może wskazywać na zaburzenie bariery filtracyjnej albo innych mechanizmów nerkowych.



ALBUMINURIA

Oznacza zwiększone wydalanie albuminy z moczem. Może być ważnym markerem uszkodzenia nerek nawet wtedy, gdy eGFR nie jest jeszcze wyraźnie obniżony.

albuminuria C białkomocz



albuminuria jest określonym rodzajem nieprawidłowego wydalenia białka.



BIAŁKOMOC

To szersze pojęcie obejmujące zwiększone wydalanie białek z moczem.



Jak raportuje się wynik?

- ocenę stężenia w pojedynczej próbce,
- stosunek albuminy do kreatyniny,
- stosunek białka do kreatyniny,
- pomiar w zbiorce dobowej.



Stosunek do kreatyniny pomaga częściowo uwzględnić różnice w rozcieńczeniu pojedynczej próbki moczu.



Nie każdy dodatni wynik jest przewlekły

Przejściowe zwiększenie wydalania białka może pojawić się w określonych sytuacjach, dlatego niektóre nieprawidłowości wymagają potwierdzenia w odpowiednim czasie i kontekście.



albuminuria ↑

Czy wynik jest powtarzalny?



Czy występuje obniżone eGFR?



Czy są inne nieprawidłowości w moczu?



Czy obraz kliniczny wskazuje na przewlekły czy ostry proces?



Filtracja i uszkodzenie to nie to samo.

- nieprawidłowy marker uszkodzenia przy względnie zachowanej filtracji,
- obniżoną filtrację bez dużej albuminurii.

Badanie ogólne moczu: mały raport, dużo wskazówek

Badanie moczu należy czytać jako zestaw współzależnych informacji fizycznych, chemicznych i mikroskopowych.

1 STREFA 1 — CECHY FIZYCZNE



- barwa,
- przejrzystość,
- ciężar właściwy.



Mogą dostarczyć informacji m.in. o zagęszczeniu próbki i obecności określonych składników.

2 STREFA 2 — TEST CHEMICZNY



- pH,
- białko,
- glukoza,
- ciała ketonowe,
- krew / hemoglobina,
- azotyny,
- esteraza leukocytowa.




Dodatni wynik testu paskowego jest wskazówką, a nie zawsze ostateczną identyfikacją przyczyny.

3 STREFA 3 — OSAD MOCZU



- erytrocyty,
- leukocyty,
- komórki nabłonkowe,
- wałeczki,
- kryształy,
- drobnoustroje.



erytrocyty | leukocyty | wałeczki



Łącz wyniki

1

krew w teście paskowym



+

erytrocyty w osadzie



→

informacja bardziej spójna niż pojedynczy parametr.

2

esteraza leukocytowa



+

leukocyty



+

azotyny



→

wzorec może wspierać podejrzenie procesu zapalnego lub zakaźnego, ale wymaga kontekstu klinicznego.

3

białko



+

nieprawidłowy osad



→

warto ocenić razem z kreatyniną, eGFR i ilościową oceną białka/albuminy.



Nie pomijaj jakości próbki

Zanieczyszczenie próbki może prowadzić do mylących wyników.



sposób pobrania,



czas od pobrania do analizy,



przechowywanie,



obecność licznych komórek nabłonkowych.



**Badanie moczu nie jest listą „plusów i minusów”.
To mapa procesu zachodzącego w układzie moczowym.**

Typowe wzorce nerkowe: zaczynij myśleć mechanizmem

Najbardziej użyteczna interpretacja wynika z połączenia filtracji, markerów uszkodzenia, elektrolitów oraz zmian w moczu.

A WZORZEC A – FILTRACJA POGARSZA SIĘ



Kreatynina ↑
eGFR ↓

- ? Czy zmiana jest nagła czy przewlekła?
- ? Jak wyglądają poprzednie wyniki?
- ? Czy występuje odwodnienie lub zmiana perfuzji?
- ? Czy są leki wpływające na nerki lub kreatyninę?

B WZORZEC B – MARKER USZKODZENIA PRZY ZACHOWANEJ FILTRACJI



eGFR względnie
zachowany
albuminuria ↑

- i Brak wyraźnego spadku eGFR nie wyklucza uszkodzenia nerek.


C WZORZEC C – ZABURZENIA ELEKTROLITOWE



K⁺ ↑ lub ↓
Na⁺ nieprawidłowe
HCO₃⁻ zmienione

- ? Czy nerki prawidłowo regulują wydalanie i równowagę kwasowo-zasadową?
- i Należy jednocześnie uwzględnić leki, straty pozanerkowe i stan nawodnienia.

Trzy osie interpretacji nerek



D WZORZEC D – NIEPRAWIDŁOWY MOCZ



białko / albumina ↑
erytrocyty lub
leukocyty
+/- wałeczki

- i Charakter osadu może pomóc zawęzić mechanizm, ale wymaga oceny razem z obrazem klinicznym.



Nie pytaj: „Czy kreatynina jest wysoka?”

Pytaj: „Która funkcja nerek wydaje się zaburzona i jakie wyniki to wspierają?”

Przypadek kliniczny: czy problem naprawdę leży w nerkach?

Nauczyć czytelnika oddzielać obserwację laboratoryjną od mechanizmu i od ostatecznego wniosku.



KARTA PACJENTA

Fikcyjny przypadek edukacyjny



Pacjent: osoba dorosła



Powód badania:

osłabienie i zmniejszone przyjmowanie płynów



Dane dodatkowe:

kilka dni gorszego nawodnienia



Wyniki:

- kreatynina: ↑
- eGFR: ↓
- mocznik: ↑
- sód: górna część zakresu / lekko ↑
- potas: ↔
- albuminuria: brak istotnego wzrostu
- badanie moczu: mocz zagęszczony, bez wyraźnych cech aktywnego osadu



Najważniejsza lekcja

Nie każda nieprawidłowa kreatynina oznacza pierwotną chorobę strukturalną nerek.



TOK ROZUMOWANIA

1



CO WIDZĘ?

Filtracja wydaje się pogorszona:
kreatynina ↑ + eGFR ↓

2



CO JESZCZE PASUJE?

Mocznik jest podwyższony.
Mocz jest zagęszczony. Wywiad sugeruje zmniejszoną podaż płynów.

3



CZEGO NIE WIDZĘ?

Brak wyraźnej albuminurii.
Brak aktywnego osadu moczu.
Brak istotnej hiperkaliemii.

4



JAKI MECHANIZM NALEŻY ROZWAŻYĆ?

Zmniejszona efektywna perfuzja nerek związana z odwodnieniem może być jednym z możliwych mechanizmów.

To nie jest jeszcze ostateczna diagnoza.

5



CO NALEŻY SPRAWDZIĆ DALEJ?

- wcześniejsze wyniki kreatyniny,
- stan nawodnienia,
- ciśnienie tętnicze,
- przyjmowane leki,
- bilans płynów,
- trend po odpowiednim postępowaniu klinicznym.



WYNIK



WZORZEC



MECHANIZM



KONTEKST



DAJSZE PYTANIE
KLINICZNE




Teraz zastosujemy tę samą logikę do narządu, którego markery często są błędnie nazywane „testami funkcji” — wątroby.

MODUŁ 04

Ocena funkcji wątroby

Uszkodzenie, cholestaza i synteza — trzy różne pytania

Nauczyć czytelnika rozróżniać markery uszkodzenia komórek wątroby, cholestazy oraz zdolności syntetycznej, aby nie interpretować wszystkich „prób wątrobowych” jako jednego procesu.



W tym module:

- ALT i AST,
- ALP i GGT,
- bilirubina,
- albumina i funkcja syntetyczna,
- wzorzec hepatocytarny i cholestatyczny,
- integracja wyników w przypadku klinicznym.



Nie każdy „wynik wątrobowy” mierzy funkcję wątroby.


ALT i AST: markery uszkodzenia, nie prosty test „wydolności”

ALT i AST mogą wzrastać przy uszkodzeniu komórek, ale ich interpretacja wymaga znajomości rozmieszczenia tych enzymów oraz całego wzorca laboratoryjnego.

1


ALT

ALT jest enzymem silnie kojarzonym z hepatocytami. Podwyższona aktywność może wspierać obecność procesu prowadzącego do uszkodzenia komórek wątroby.



AST

AST występuje również poza wątrobą, m.in. w mięśniach. Dlatego wzrost AST może mieć źródło pozawątrobowe.




2

uszkodzenie
hepatocytu



uwolnienie
enzymów



ALT / AST
we krwi ↑



3



Wysokie ALT lub AST nie mówi automatycznie, jak dobrze wątroba wykonuje swoje funkcje syntetyczne.

To przede wszystkim informacja o uszkodzeniu komórkowym.

4

Jak czytać ALT i AST?

1



Czy oba enzymy są podwyższone?

2



Który wzrost bardziej?

3



Jak bardzo są podwyższone względem zakresu referencyjnego?

4



Jak wyglądają ALP, GGT i bilirubina?

5



Czy istnieje możliwe źródło pozawątrobowe, zwłaszcza mięśniowe?



Mini-przykład

AST ↑
ALT ↔ lub niewielkie ↑
CK znacznie ↑



należy rozważyć, czy mięśnie mogą być istotnym źródłem AST.



Nie interpretuj:

AST ↑ = choroba wątroby



Interpretuj:

AST ↑ → ustal źródło enzymu na podstawie całego panelu.



**ALT i AST mówią przede wszystkim o uszkodzeniu komórek.
Nie odpowiadają samodzielnie na pytanie o funkcję całego narządu.**

ALP i GGT: kiedy wzorzec kieruje uwagę na drogi żółciowe




ALP i GGT pomagają rozpoznawać wzorce związane z układem hepatobiliarnym, ale szczególnie ALP może mieć również inne źródła.

1 ALP – fosfataza alkaliczna

ALP występuje m.in. w:

- drogach żółciowych,
- kościach,
- innych tkankach.



i Dlatego izolowany wzrost ALP nie wskazuje automatycznie na wątrobę.

2 GGT


GGT jest enzymem często interpretowanym w kontekście układu hepatobiliarnego. Może pomagać ocenić, czy podwyższona ALP prawdopodobnie ma źródło związane z wątrobą lub drogami żółciowymi.



i To schemat orientacyjny, nie samodzielne kryterium diagnostyczne.

3 Co to jest cholestaza?


Cholestaza oznacza zaburzenie prawidłowego powstawania lub przepływu żółci. Może prowadzić do charakterystycznego wzorca zmian laboratoryjnych.



4 Schemat interpretacyjny



Nie czytaj jednego enzymu w izolacji




ALP odpowiada na pytanie „gdzie może być źródło?”.
GGT może pomóc zawęzić interpretację.



Na kolejnej stronie dołączymy bilirubinę – marker, który pomaga połączyć metabolizm hemu, wątrobę i przepływ żółci.

Bilirubina: od rozpadu hemu do wydalania z żółcią

Bilirubina jest produktem przemian hemu. Jej wzrost może wynikać z większej produkcji, zaburzeń wychwyty i sprzęgania w wątrobie albo utrudnionego wydalania z żółcią.



1



BILIRUBINA NIESPRĘŻONA

Powstaje w układzie siateczkowo-śródbłonkowym ze złamania hemu. Jest lipofilna, związana z albuminą i transportowana do wątroby.

Wzrost tej frakcji może wynikać z:

- zwiększonej produkcji bilirubiny (np. hemoliza),
- zaburzenia wychwyty przez hepatocyty,
- zaburzenia procesu sprzęgania (glukuronidacji).

2



BILIRUBINA SPRĘŻONA

Powstaje w hepatocytach w wyniku sprzęgania z kwasem glukuronowym. Jest hydrofilna i wydalana z żółcią do jelita.

Wzrost tej frakcji może wynikać z:

- zaburzeń wydalania z hepatocytu,
- cholestazy (wewnątrzwątrobowej lub pozawątrobowej),
- utrudnionego odpływu żółci.

?

3 Trzy pytania do bilirubiny

- 1 Czy wzrost dotyczy głównie frakcji niesprężonej czy sprężonej?
- 2 Jak wyglądają ALT, AST, ALP i GGT?
- 3 Czy występują objawy lub dane wskazujące na hemolizę albo cholestazę?



Bilirubina niesprężona ↑
+ markery hemolizy
nieprawidłowe



rozważ zwiększoną
produkcję bilirubiny
jako jeden z mechanizmów.



Bilirubina sprężona ↑
+ ALP ↑ + GGT ↑



wzorec może
kierować uwagę na
zaburzenie odpływu żółci.



Bilirubina całkowita bez rozróżnienia frakcji daje mniej informacji o mechanizmie.



Najpierw ustal, która frakcja rośnie. Potem pytaj dlaczego.

Albumina i synteza: kiedy pytamy nie o uszkodzenie, lecz o funkcję

ALT i AST informują głównie o uszkodzeniu komórek, natomiast albumina i wybrane parametry krzepnięcia pomagają oceniać zdolność wątroby do syntezy białek.



ALBUMINA

Albumina jest syntetyzowana głównie w wątrobie. Jej obniżenie może występować przy upośledzonej syntezie, ale również w wielu innych sytuacjach.

Możliwe mechanizmy albuminy ↓:

- zmniejszona produkcja
- zwiększona utrata przez nerki
- utrata przez przewód pokarmowy
- stan zapalny
- redystrybucja
- rozcieńczenie



Niska albumina nie jest swoista dla niewydolności wątroby.



PARAMETRY KRZEPNIĘCIA


Wątroba syntetyzuje wiele białek biorących udział w krzepnięciu. Dlatego zaburzenia określonych parametrów krzepnięcia mogą, w odpowiednim kontekście, wskazywać na pogorszenie zdolności syntetycznej.



Interpretacja zależy m.in. od stosowanych leków przeciwkrzepliwych, niedoborów witamin i innych czynników.



albumina



inne białka osocza



białka
krzepnięcia

Uszkodzenie vs funkcja

	Czy hepatocyty są uszkodzane?	ALT, AST
	Czy istnieje wzorzec cholestazy?	ALP, GGT, bilirubina
	Czy synteza jest upośledzona?	albumina, wybrane parametry krzepnięcia



Pacjent może mieć bardzo wysokie ALT i jednocześnie względnie zachowaną funkcję syntetyczną. Może też mieć niewielkie podwyższenie enzymów, a jednocześnie istotne zaburzenie syntezy.



Uszkodzenie nie jest tym samym co niewydolność.

Hepatocytarny czy cholestatyczny?

Rozpoznaj dominujący wzorzec

Interpretacja panelu wątrobowego staje się dużo łatwiejsza, gdy najpierw ustalimy, czy dominują zmiany związane z uszkodzeniem hepatocytów, czy z cholestazą.

A WZORZEC HEPATOCYTARNY



Dominujące markery:

- ALT ↑
- AST ↑




ALP może być prawidłowe albo tylko umiarkowanie podwyższone.



Pytanie biologiczne:

Czy głównym procesem jest uszkodzenie komórek wątroby?



B WZORZEC CHOLESTATYCZNY



Dominujące markery:

- ALP ↑
- GGT ↑
- często bilirubina ↑




ALT i AST mogą być podwyższone, ale zwykle nie dominują.



Pytanie biologiczne:

Czy głównym problemem jest zaburzony przepływ żółci?



A jeśli wszystko jest podwyższone?

Wtedy możliwy jest: wzorzec mieszany, czyli współistnienie cech uszkodzenia hepatocytów i cholestazy.

Sześciostopniowa ścieżka interpretacji

- 1 Oceń ALT i AST.
- 2 Oceń ALP i GGT.
- 3 Sprawdź bilirubinę.
- 4 Porównaj względną intensywność zmian.
- 5 Dodaj albuminę i parametry syntezy.
- 6 Oceń trend i kontekst kliniczny.



Nie diagnozuj na podstawie wzorca

Wzorzec wskazuje rodzaj procesu, ale nie musi określać jego przyczyny. Ten sam wzorzec może mieć różne etiologie.



**Najpierw określ typ wzorca.
Dopiero potem szukaj przyczyny.**

Przypadek kliniczny: co naprawdę mówi panel wątrobowy?

Przećwiczyć rozpoznawanie wzorca zamiast automatycznego przypisywania diagnozy.



KARTA PACJENTA

Fikcyjny przypadek edukacyjny



Pacjent: osoba dorosła



Powód badania:

osłabienie, świąd skóry,
ciemniejszy mocz



Wyniki:

- ALT: lekko ↑
- AST: lekko ↑
- ALP: wyraźnie ↑
- GGT: wyraźnie ↑
- bilirubina sprzężona: ↑
- albumina: ↔



Najważniejsza lekcja

Panel wątrobowy działa najlepiej
jako system wzorców, a nie lista
osobnych odchyleń.



TOK ROZUMOWANIA

1



KROK 1 — CO DOMINUJE?

ALP i GGT są podwyższone bardziej
niż ALT i AST.

Wniosek: Dominujący wzorec jest
cholestatyczny.

2



KROK 2 — CO WSPERA TEN WZORZEC?

Bilirubina sprzężona jest podwyższona.
Objawy mogą być zgodne z
utrudnionym przepływem żółci.

3



KROK 3 — CO MÓWI ALBUMINA?

Albumina pozostaje w zakresie.
To nie wyklucza procesu wątrobowego,
ale nie sugeruje na tej podstawie
wyraźnego upośledzenia syntezy.

4



KROK 4 — JAKIE PYTANIE JEST NASTĘPNE?

Co może powodować cholestazę
i jakie badania lub dane kliniczne
pozwolą ustalić przyczynę?

5



KROK 5 — CO NALEŻY SPRAWDZIĆ?

- wywiad lekowy
- alkohol
- objawy bólowe
- obrazowanie dróg żółciowych, jeśli wskazane
- wcześniejsze wyniki
- dynamikę bilirubiny i enzymów

SYNTEZA: OD WYNIKÓW DO WNIOSKU



ALT/AST

+



ALP/GGT

+



bilirubina

+



albumina/synteza

+



kontekst

=




logiczna
interpretacja

MODUŁ 05

Biomarkery sercowe

Uszkodzenie mięśnia sercowego, przeciążenie i kontekst kliniczny

Nauczyć czytelnika interpretować najważniejsze biomarkery związane z sercem, rozumieć ich dynamikę w czasie oraz unikać błędu polegającego na utożsamianiu dodatniego markera z jedną konkretną diagnozą.



W tym module:

- troponina;
- CK-MB i jej ograniczenia;
- BNP i NT-proBNP;
- znaczenie czasu i dynamiki wyniku;
- integracja biomarkerów z objawami i badaniami dodatkowymi.




Marker sercowy bez czasu i kontekstu może być mylący.

Troponina: najpierw wykryj uszkodzenie, potem ustal jego przyczynę

Podwyższone stężenie troponiny wskazuje na uszkodzenie mięśnia sercowego, ale nie mówi samodzielnie, dlaczego do niego doszło.

Troponiny sercowe są białkami związanymi z aparatem kurczliwym kardiomiocytów. Gdy dochodzi do uszkodzenia komórek mięśnia sercowego, troponina może być uwalniana do krwi.



Najważniejsze pytanie

Troponina $\uparrow$ = uszkodzenie mięśnia sercowego


Troponina $\uparrow \neq$ automatycznie jedna konkretna przyczyna

Interpretacja wymaga kontekstu klinicznego:

- objawy
- zapis EKG
- dynamika troponiny
- czas od początku objawów
- funkcja nerek
- inne ostre choroby



Dynamika jest kluczowa



STABILNIE

NARASTANIE

SPADEK

Zmiana stężenia w czasie może dostarczyć istotniejszych informacji niż pojedynczy wynik.



Troponina wyskoczyła

Nowoczesne wysokoczułe oznaczenia mogą wykrywać bardzo małe ilości troponiny. Oznacza to większą zdolność wykrywania uszkodzenia, ale również większą potrzebę prawidłowego rozumienia kontekstu.



Podejście praktyczne: 4 kluczowe pytania

- 1 Jak wysoki jest wynik względem odpowiedniego progu dla metody?
- 2 Czy zmienia się w czasie?
- 3 Czy obraz kliniczny wskazuje na ostre niedokrwienie?
- 4 Czy istnieje inny mechanizm uszkodzenia mięśnia sercowego?



Troponina wykrywa uszkodzenie. Przyczynę ustala się klinicznie.

CK-MB: marker pomocniczy z ważnymi ograniczeniami

CK-MB była szeroko wykorzystywana do oceny uszkodzenia mięśnia sercowego, ale obecnie w wielu zastosowaniach troponina jest markerem bardziej swoistym i czułym.

CK

CK — kinaza kreatynowa


Kinaza kreatynowa jest enzymem związanym z metabolizmem energetycznym mięśni. Występuje w różnych tkankach.

CK-MB

CK-MB

Jest izoenzymem CK obecnym w większej proporcji w mięśniu sercowym, ale nie jest absolutnie swoisty wyłącznie dla serca.

CK całkowita
→ mięśnie



CK-MB

→ większe powiązanie z sercem, ale możliwość źródła pozasercowego

Dlaczego troponina często ma przewagę?

	Troponina	CK-MB
Swoistość dla uszkodzenia mięśnia sercowego	większa	mniejsza
Czułość przy małym uszkodzeniu	zwykle większa	mniejsza
Możliwe wpływy mięśni szkieletowych	mniejsze	większe
Znaczenie współczesne	podstawowy marker w wielu algorytmach	zastosowanie bardziej ograniczone



Nie wyrzucaj kontekstu

- uraz mięśni
- intensywny wysiłek
- choroby mięśni
- inne źródła wzrostu CK



Przykład kliniczny

CK całkowita znacznie ↑;
CK-MB ↑;
troponina bez istotnej zmiany →


należy rozważyć możliwość dominującego źródła mięśniowego.



CK-MB może uzupełniać obraz, ale nie powinna być automatycznie traktowana jako równoważna troponinie.

BNP i NT-proBNP: sygnał przeciążenia ściany serca

Peptydy natriuretyczne pomagają oceniać odpowiedź serca na zwiększone napięcie i przeciążenie objętościowe lub ciśnieniowe, ale ich stężenie zależy również od wielu cech pacjenta.



BNP

Aktywny biologicznie peptyd powstający w związku z odpowiedzią mięśnia sercowego na przeciążenie.



NT-proBNP

Nieaktywny fragment powstający podczas tego samego procesu prekursorowego. Oba markery są stosowane klinicznie, ale nie mają identycznych wartości ani zakresów interpretacyjnych.

Co może zwiększać BNP / NT-proBNP?

- wiek
- funkcja nerek
- zaburzenia rytmu
- ostre choroby
- inne stany powodujące obciążenie serca

Co może wpływać na niższe wartości?



Niektóre cechy metaboliczne i składu ciała mogą modyfikować stężenia, dlatego pojedynczy wynik nie powinien być interpretowany w oderwaniu od pacjenta.

Schemat interpretacyjny



BNP/NT-proBNP ↑



Czy są objawy zgodne z przeciążeniem serca?



Jak wygląda funkcja nerek?



Czy wynik jest zgodny z badaniem fizykalnym i obrazowym?



Czy trend zmienia się wraz ze stanem klinicznym?



Troponina

uszkodzenie kardiomiocytów



BNP / NT-proBNP


przeciążenie i rozciąganie ściany serca



Te markery odpowiadają na inne pytania biologiczne.

Marker sercowy bez kontekstu to tylko część historii

Prawidłowa interpretacja biomarkerów sercowych wymaga połączenia wyniku z objawami, czasem, EKG, funkcją nerek i dynamiką zmian.



Pułapka interpretacyjna

„Troponina ↑ + brak typowego obrazu klinicznego”

nie oznacza „zignoruj wynik”

nie oznacza „automatycznie rozpoznaj zawał”

oznacza: „ustal mechanizm uszkodzenia mięśnia sercowego.”



Serce interpretuje się w czasie, nie w pojedynczym punkcie.

Przypadek kliniczny: ból w klatce piersiowej i podwyższona troponina

Nauczyć czytelnika łączyć marker z dynamiką i kontekstem,
zamiast traktować pojedynczą wartość jako ostateczny wniosek.



KARTA PACJENTA



Pacjent: osoba dorosła



Objaw: ból w klatce piersiowej
od kilku godzin.



Dane dodatkowe: obecne
czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.



Wyniki początkowe:

- troponina: lekko ↑
- kreatynina: ↔
- elektrolity: bez istotnych odchyień



Kontrola po określonym czasie:

- troponina: wyraźnie ↑ względem
pierwszego pomiaru.



EKG wykazuje zmianę wymagającą
pilnej oceny klinicznej.



TOK ROZUMOWANIA

1



KROK 1 — CZY JEST USZKODZENIE?

Tak. Troponina przekracza odpowiedni
próg dla metody.

2



KROK 2 — CZY JEST DYNAMIKA?

Tak. Troponina wyraźnie wzrasta w kolejnym
pomiarze.

Znaczenie: Wzorec bardziej odpowiada
ostremu procesowi niż stabilnemu
przewlekłemu podwyższeniu.

3



KROK 3 — CZY KONTEKST PASUJE?

Pacjent ma ból w klatce piersiowej.
Występują dodatkowe dane kardiologiczne.
To zwiększa znaczenie obserwowanej
dynamiki biomarkera.

4



KROK 4 — CZEGO TROPONINA NIE MÓWI SAMĄ?

- mechanizmu niedokrwienia
- lokalizacji zmian
- pełnej przyczyny objawów
- sposobu leczenia



Te elementy wynikają z pełnej oceny klinicznej.



PORÓWNAJ Z INNĄ SYTUACJĄ



Pacjent B:

- brak bólu w klatce piersiowej
- ciężka choroba ogólnoustrojowa
- troponina lekko ↑
- kolejne wyniki stabilne



**Czy ten sam poziom troponiny
musi oznaczać ten sam proces?**

Nie. Wzorec zmian i kontekst mogą
prowadzić do zupełnie innej interpretacji.



ALGORYTM BIOMARKERA SERCOWEGO

1

Czy marker jest nieprawidłowy?



2

Czy zmienia się w czasie?



3

Czy objawy pasują?



4

Czy EKG i inne dane wspierają ten sam mechanizm?



5

Czy istnieje alternatywna przyczyna uszkodzenia?



**W następnym module połączymy biomarkery z różnymi układów
i nauczymy się budować jeden spójny obraz kliniczny.**


MODUŁ 06

Łączenie wyników w obraz kliniczny

Największa wartość pojawia się wtedy, gdy przestajesz analizować parametry osobno

Nauczyć czytelnika integrować markery z różnych układów,
rozpoznawać wspólne mechanizmy oraz identyfikować sytuacje,
w których jedna nieprawidłowość wpływa na interpretację innej.

JEDEN PACJENT — WIELE UKŁADÓW — JEDEN OBRAZ



W tym module:

- gospodarka żelazowa
- markery stanu zapalnego
- amylaza i lipaza
- TSH i hormony tarczycy
- uniwersalny algorytm interpretacji



Nieprawidłowy wynik zaczyna mieć znaczenie dopiero wtedy, gdy połączysz go z mechanizmem.

Gospodarka żelazowa: nie oceniaj jej jednym parametrem

Ocena gospodarki żelazowej wymaga połączenia informacji o zapasach, transporcie, dostępności żelaza oraz wpływie stanu zapalnego.



1 FERRYTYNA

Ferrytyna odzwierciedla zapasy żelaza w organizmie, ale jest także białkiem ostrej fazy — rośnie w odpowiedzi na stan zapalny.



Ferrytyna prawidłowa lub podwyższona nie zawsze wyklucza niedobór żelaza, jeśli jednocześnie występuje stan zapalny.

2



ŻELAZO W SUROWICY

Pokazuje ilość żelaza krążącego w danym momencie.

Odczyt ten jest zmienny i nie powinien być interpretowany samodzielnie.

3



TRANSFERYNA

Główne białko transportujące żelazo w surowicy krwi.

4



WYSYCENIE TRANSFERYNY

Informuje, jaki odsetek zdolności transportowej transferyny jest obecnie zajęty przez żelazo.

ZAPASY



ferrytyna

TRANSPORT



transferyna

DOSTĘPNOŚĆ



wysycenie transferyny



Wzorzec A — niedobór żelaza

- ferrytyna ↓
- wysycenie transferyny ↓
- inne parametry zgodne z niedoborem



Wzorzec B — stan zapalny

- ferrytyna ↔ lub ↑
- żelazo dostępne ↓
- markery zapalne ↑



Nie pytaj: 'Czy ferrytyna jest prawidłowa?'

Pytaj: 'Czy zapasy, transport i stan zapalny tworzą spójny obraz?'

Markery stanu zapalnego: sygnał procesu, nie mapa lokalizacji

Markery stanu zapalnego pomagają wykryć i monitorować odpowiedź zapalną organizmu, ale zazwyczaj nie wskazują samodzielnie przyczyny ani lokalizacji procesu.



CRP

Białko C-reaktywne (CRP) to białko ostrej fazy syntetyzowane głównie w wątrobie pod wpływem cytokin prozapalnych (np. IL-6). Stężenie CRP może szybko rosnąć i szybko spadać wraz z nasileniem lub ustępowaniem procesu zapalnego.



OB

Odczyn Biernackiego (OB) to pośredni wskaźnik zapalenia, zależny od białek osocza (np. fibrynogenu) oraz właściwości erytrocytów (liczby, kształtu, podatności na agregację). Zmienia się zwykle wolniej niż CRP.

Cecha	CRP	OB
dynamika	szybsza	wolniejsza
swoistość dla przyczyny	niska	niska
wpływ innych czynników	obecny	często duży

Co oznacza wzrost?

Podwyższone markery zapalne nie określają automatycznie:


- infekcji
- choroby autoimmunologicznej
- urazu
- nowotworu
- konkretnego narządu

CRP ↑ + ALT ↑

Nie oznacza automatycznie, że stan zapalny pochodzi z wątroby.



Czy istnieje wspólny mechanizm, czy dwie równoległe nieprawidłowości?



**Marker zapalny mówi: 'coś się dzieje'.
Kontekst mówi: 'co i gdzie'.**

Amylaza i lipaza: enzymy trzustkowe w praktycznej interpretacji

Amylaza i lipaza mogą wzrastać w procesach trzustkowych,
ale różnią się specyficznością i możliwymi pozatrzustkowymi źródłami.

AMYLAZA

Uczestniczy w trawieniu węglowodanów.
Występuje w trzustce i śliniankach, dlatego nie jest swoista wyłącznie dla trzustki.




trzustka + ślinianki

LIPAZA

Uczestniczy w trawieniu tłuszczów.
Często ma silniejsze skojarzenie z procesami trzustkowymi niż amylaza, ale nadal wymaga kontekstu.



silniejsze skojarzenie
z trzustką



Nie interpretuj enzymu bez objawów



charakter bólu



czas od początku objawów



inne choroby



funkcja nerek



leki



badania obrazowe, jeśli są wskazane



ból nadbrzusza

+

lipaza wyraźnie ↑



wzorec może silniej kierować uwagę
na trzustkę niż izolowany niewielki
wzrost enzymu bez objawów.




Stopień wzrostu enzymu nie powinien być automatycznie utożsamiany z ciężkością choroby.



**Enzym pomaga rozpoznać kierunek diagnostyczny,
ale nie zastępuje obrazu klinicznego.**

TSH i hormony tarczycy: czytaj oś, nie pojedynczy wynik

Interpretacja tarczycy opiera się na sprzężeniu zwrotnym pomiędzy przysadką a hormonami tarczycy.



TSH

Pobudza tarczycę i jest bardzo czułą częścią osi.



FT4

Wolna tyroksyna odzwierciedla hormon biologicznie dostępny.



FT3

Wolna trójiodotyronina może być istotna w wybranych sytuacjach, ale nie zawsze jest badaniem pierwszego wyboru.



Wzorzec 1

TSH ↑ + FT4 ↓

wzorzec może odpowiadać pierwotnej niedoczynności tarczycy



Wzorzec 2

TSH ↓ + FT4 ↑

wzorzec może odpowiadać nadczynności tarczycy



Wzorzec 3

TSH nieadekwatne do FT4

należy zastanowić się, czy problem może dotyczyć innego poziomu osi regulacyjnej lub interferencji



Pułapki

- ciężka choroba ogólnoustrojowa
- ciąża
- leki
- suplementy
- zmienność metody laboratoryjnej
- zaburzenia osi podwzgórze–przysadka–tarczyca



TSH mówi, jak przysadka reaguje. FT4 pokazuje, ile hormonu jest dostępne. Razem tworzą wzorzec.

Uniwersalny algorytm interpretacji wyników

Od surowej liczby do logicznego pytania klinicznego

To uniwersalna, praktyczna procedura, którą możesz zastosować przy interpretacji prawie każdego panelu biochemicznego.



5 pytań, które warto zapamiętać

- 1 Co mierzy ten marker?
- 2 Co może go zmienić poza chorobą?
- 3 Które wyniki powinny zmienić się razem z nim?
- 4 Czy obserwowany wzorec jest spójny?
- 5 Co muszę sprawdzić dalej?




MODUŁ 07

Przypadki kliniczne i podsumowanie

Teraz połącz wszystko

W tym module sprawdzisz, czy potrafisz zastosować wcześniejsze zasady do wieloparametrowych przypadków klinicznych i zakończysz materiał praktyczną mapą interpretacji.



W tym module:

- przypadek łączący nerki i elektrolity
- przypadek łączący metabolizm, wątrobę i serce
- końcowa mapa interpretacji
- najważniejsze zasady bezpieczeństwa interpretacyjnego
- sekcja źródeł i dalszej nauki



Dobry interpretator nie zgaduje. Buduje hipotezę z danych.

Przypadek 1: nerki, potas i odwodnienie

Nauczyć czytelnika łączyć marker z dynamiką i kontekstem,
zamiast traktować pojedynczą wartość jako ostateczny wniosek.



KARTA PACJENTA



Pacjent: osoba starsza



Powód badania:

osłabienie, zawroty głowy,
zmniejszona podaż płynów



Leki: preparat wpływający
na układ renina–angiotensyna
oraz lek moczopędny

Wyniki badań laboratoryjnych:



kreatynina ↑



eGFR ↓



mocznik ↑



potas ↑



sód ↔



HCO₃⁻ lekko ↓



mocz zagęszczony



albuminuria bez dużego wzrostu



TOK ROZUMOWANIA

1



CO DOMINUJE?

Występują cechy pogorszenia filtracji:
kreatynina ↑ + eGFR ↓

2



CZY ISTNIEJE CZYNNIK HEMODYNAMICZNY?

Tak, zmniejszona podaż płynów może
zmniejszać perfuzję nerek.

3



JAK INTERPRETOWAĆ POTAS?

Potas może być związany ze zmniejszonym
wydalaniem nerkowym, lekami i równowagą
kwasowo-zasadową. Sprawdź też, czy próbka
nie była hemolizowana.

4



CO WNOSI MOCZ?

Mocz zagęszczony wspiera hipotezę zmniejszonej
dostępności wody. Brak dużej albuminurii nie
wyklucza problemu o charakterze czynnościowym.

5



CO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ?

- poprzednią kreatyninę
- leki
- stan nawodnienia
- ciśnienie tętnicze
- powtórny potas
- jakość próbki
- dynamikę po zmianie sytuacji klinicznej



Najważniejszy mechanizm

**NERKI + LEKI + NAWODNIENIE +
ELEKTROLITY muszą być
interpretowane razem.**



**Który z wyników byłby najbardziej
niebezpieczny do interpretowania bez
sprawdzenia próbki i leków?**



Potas.

Wynik może być fałszywie podwyższony
(hemoliza, zła jakość próbki) lub rzeczywiście
groźny — decyzje kliniczne zależą od weryfikacji
próbki i kontekstu leczenia.

Przypadek 2: kiedy kilka układów opowiada tę samą historię



KARTA PACJENTA



Pacjent: osoba dorosła



Powód badania:
narastająca męczliwość
i duszność wysiłkowa



Dane dodatkowe:
nadmierna masa ciała,
nadciśnienie



WYNIKI

- | | |
|--------------|---------------|
| glukoza | ↑ |
| HbA1c | ↑ |
| triglicerydy | ↑ |
| HDL-C | obniżone |
| ALT | lekko ↑ |
| AST | ↔ lub lekko ↑ |
| GGT | lekko ↑ |
| NT-proBNP | ↑ |
| kreatynina | ↔ |
| eGFR | zachowany |



TOK ROZUMOWANIA

1

POGRUPUJ WYNIKI

Metabolizm

- glukoza ↑
- HbA1c ↑
- triglicerydy ↑
- HDL-C obniżone

Wątroba

- ALT lekko ↑
- GGT lekko ↑

Serce

- NT-proBNP ↑

2

CZY WYNIKI MOGĄ SIĘ ŁĄCZYĆ?

Czynniki metaboliczne mogą współistnieć z zaburzeniami lipidowymi, zmianami wątrobowymi i większym ryzykiem sercowo-naczyniowym, lecz nie należy automatycznie przypisywać wszystkim nieprawidłowościom jednego wspólnego mechanizmu.

3



CO WYMAGA OSOBNEJ OCENY?

NT-proBNP należy interpretować w kontekście duszności, wieku, czynności nerek, badania przedmiotowego oraz możliwego obrazowania serca.

4



CO MÓWI ALT?

Łagodny wzrost ALT to sygnał, nie rozpoznanie. Porównaj z AST, GGT, profilem metabolicznym, lekami, alkoholem i obrazowaniem (jeśli wskazane).

5

JAK ZBUDOWAĆ HIPOTEZĘ?

- 1 najpierw „wspólny profil metaboliczny”
- 2 oddzielna ocena możliwego przeciężenia serca
- 3 oddzielna ocena źródła zmian enzymów wątrobowych



Współistnienie nie oznacza automatycznie wspólnej przyczyny.



Wymień trzy dodatkowe informacje, które najbardziej zmieniłyby interpretację tego przypadku.




- ciśnienie tętnicze i objawy
- echokardiografia lub inne dane o funkcji serca
- trend enzymów i glikemii
- leki
- styl życia
- wcześniejsze wyniki

Twoja mapa interpretacji biochemii klinicznej

Nie zapamiętuj wszystkich liczb. Zapamiętaj sposób myślenia.

1 MAPA NARZĄDÓW I MARKERÓW



2 7 ZŁOTYCH ZASAD

- 1 Wynik nie jest diagnozą.
- 2 Zakres referencyjny nie jest absolutną granicą między zdrowiem a chorobą.
- 3 Jeden marker rzadko wystarcza.
- 4 Trend może być ważniejszy niż pojedynczy pomiar.
- 5 Wzorzec powinien być biologicznie spójny.
- 6 Zawsze sprawdzaj możliwość błędu predanalizycznego.
- 7 Kontekst kliniczny jest częścią interpretacji, a nie dodatkiem do niej.

3 OSTATECZNY ALGORYTM



To jest sposób myślenia, który powinien zostać z Tobą po zamknięciu tej książki.

4 ZANIM WYCIĄGNIESZ WNIOSEK...

- ✓ Czy sprawdziłem próbkę?
- ✓ Czy rozumiem, co mierzy marker?
- ✓ Czy połączyłem go z innymi wynikami?
- ✓ Czy uwzględniłem leki i stan pacjenta?
- ✓ Czy mam wcześniejsze wyniki?
- ✓ Czy wynik wymaga pilnej oceny klinicznej?

5 ŹRÓDŁA I DALSZA NAUKA

Finalne progi rozstrzygające powinny opierać się na aktualnych i wiarygodnych źródłach. Należą do nich zalecenia towarzystw naukowych (nefrologia, kardiologia, hepatologia, diabetologia, diagnostyka tarczycy), instrukcje i zakresy referencyjne konkretnego laboratorium oraz podręczniki i publikacje recenzowane w medycynie laboratoryjnej.



W finalnym materiale nie podawać uniwersalnych progów diagnostycznych bez podania źródła, metody lub odpowiedniego kontekstu klinicznego.



Dobra interpretacja nie polega na zgadywaniu choroby z jednej liczby. Polega na zadawaniu właściwych pytań we właściwej kolejności.